



Flash info médicament

Administration des diverses
formes orales – formes liquides

Les diverses voies d'administration

- Orale
- Parentérale
- Rectale
- Vaginale
- Ophtalmique
- ORL
- Respiratoire
- Topique
- transdermique

La forme orale

Solides



- Comprimé
- Gélule
- Dragée
- Poudre
- Granules

Liquides



- Sirop
- Solution buvable
- Suspension
- Ampoule
- Huile

La forme orale liquide


Avantages

- Déglutition plus facile vs forme solide
- Flexibilité dans le dosage
- Principe actif plus facilement absorbé et agit plus vite

Désavantages

- Conservation, date de péremption plus courte
- Conditionnement plus onéreux et plus volumineux
- La précision et l'exactitude des doses dépendent de la personne qui administre la forme liquide

Forme orale liquide - conservation



Toujours noter sur l'emballage la date de l'ouverture

FLACON OUVERT
LE : _____
Stabilité après ouverture : 6 mois

Forme liquide - dispensation





20 gttes ne sont pas toujours égales à 1 ml!!!

- ✓ Peut changer en fonction du compte-gouttes ou des excipients, ex:
 - Tramadol → 1 ml = 40 gouttes
 - Nozinan → 1 ml = 40 gouttes

Trop de risque d'erreur:

- ✓ Nécessite de la vigilance (bien compter les gouttes)
- ✓ La quantité délivrée dépend de la manière dont le compte-gouttes est tenu (certains distillent par le centre, d'autre par les côtés)

Forme liquide - dispensation



Forme liquide - dispensation

Recommandations afin de limiter le risque d'erreur:

Prescrire en mg



Administerer en ml



Seringues orales BAXA:


- ✓ Permettent un prélèvement précis et hermétique

Forme liquide - dispensation

seringues



adaptateurs



Mode d'emploi:

- Enlever le dispositif compte-gouttes du flacon et insérer d'adaptateur
- Insérer la seringue sur l'adaptateur, renverser le flacon, prélever le volume désiré puis retourner le flacon à l'endroit, retirer la seringue
- Utiliser soit 1 seringue par flacon, ou une seringue pour chaque administration

Administration orale de produits injectables

Les médicaments destinés à être administré en iv, im, sc ne peuvent en principe pas être administrés par voie orale.

Risques:

- Perte d'efficacité du traitement
(sensible au milieu acide (Nexium[®] iv), biodisponibilité (Mephameson[®]), effet de 1^{er} passage)
- Intolérance gastro-intestinale
(osmolarité, pH extrêmes (Phenydan[®] pH12))
- Utilisation hors indication (off-label)
- Coût (spécialités iv souvent plus coûteuses que per os)
(Atropine iv: **0.53 ct/ml** → Bellafit N: **0.23ct/ml**)

Administration orale de produits injectables

Exceptions:

Konakion[®] → peut être bu tel quel

K-Phos[®] → diluer au préalable, préférer les comprimés effervescents/ capsules Phoscap[®]

Atropin iv[®] → peut être bu tel quel

N'utiliser cette possibilité que s'il n'y a pas d'autres alternatives

Toujours valider avec la pharmacie au 4214

MERCI



Assistance pharmaceutique de la Phel: 4214