

**PROTOCOLE DE PERFUSION DU TOCILIZUMAB (ACTEMRA®)
Covid-19**

Date : _____ Date de l'injection : le _____ à _____

Coller ICI l'étiquette du patient

Lundi à vendredi 8h – 16h30	<p>Du lundi au vendredi de 8h à 16h30 la pharmacie prépare une perfusion de 100 ml, <u>prête à l'emploi</u>. Pour la commande :</p> <p>Envoyer l'ordre médical <u>par courriel</u> à phelonco@phel.ch</p> <p>Appeler la PHELONCO au 058 773 57 41 et <u>confirmer</u> le traitement</p>															
Soir, week-end et jour férié	<p>A préparer dans le service.</p> <p>Disponible sous <u>forme de kit</u> contenant le <u>matériel</u> nécessaire et le mode opératoire dans la pharmacie des Soins Intensifs (1 et 2) et les Soins Intermédiaires. <u>Les produits</u> se trouvent dans l'armoire Pyxis d'urgence de la pharmacie (PHEL, Niveau 0).</p>															
Calcul de la dose	<p><input type="checkbox"/> 8 mg/kg Poids (kg) : Soit dose totale = (Si poids >100 kg dose max = 800 mg)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Poids (kg)</th> <th>≤ 40 kg</th> <th>>40 et ≤65 kg</th> <th>>65 et ≤90 kg</th> <th>>90kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dose calculée (mg)</td> <td>8mg/Kg</td> <td>400</td> <td>600</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Volume prélevé (ml)</td> <td>Selon dose calculée</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Poids (kg)	≤ 40 kg	>40 et ≤65 kg	>65 et ≤90 kg	>90kg	Dose calculée (mg)	8mg/Kg	400	600	800	Volume prélevé (ml)	Selon dose calculée	20	30	40
Poids (kg)	≤ 40 kg	>40 et ≤65 kg	>65 et ≤90 kg	>90kg												
Dose calculée (mg)	8mg/Kg	400	600	800												
Volume prélevé (ml)	Selon dose calculée	20	30	40												
Préparation	<p>Flacons disponibles à 400 mg, 200 mg et 80 mg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Purger la tubulure avec du NaCl 0.9% - Prélever le volume d'Actemra nécessaire selon le calcul effectué - Retirer du flex de 100ml de NaCl 0.9% le volume de NaCl 0.9% correspondant au volume d'Actemra qui doit-être injecté - Injecter l'Actemra dans le flex de NaCl 0.9% <p><u>Attention</u> : incompatible avec le G5%.</p>															
Administration	<p>Afin de bien mélanger la solution, retourner la poche pour perfusion mais le faire avec précaution afin d'éviter la formation de mousse.</p>															
Mise en garde Précautions CI	<p>NE JAMAIS INJECTER EN BOLUS Administrer en 1 heure A la fin de la perfusion rincer la tubulure avec 20 ml de NaCl 0.9% A vérifier avant chaque perfusion :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hypersensibilité au principe actif et excipients - Pas de TTT simultané avec des inhibiteurs du TNF-alpha ni jusqu'à 1 mois après TTT par des anticorps anti TNF-alpha <p>Comme pour tout anticorps, considérer la possibilité de réaction d'hypersensibilité.</p>															

Timbre et signature du médecin : _____

Mise à jour : 11.05.2021