

1. Commande

Le secteur Fabrication de la PHEL prépare les poches de perfusion prêtes à l'emploi de manière aseptique. Pour la commande :

Du lundi au vendredi de 8h-16h30

- 1) Remplir l'ordonnance correspondante (mises à jour régulières sur le site de la PHEL : www.phel.ch > Coronavirus)

	Sotrovimab (Xevudy®)
Patient ambulatoire / nosocomial / découverte fortuite	Lien sur l'ordonnance


- 2) Envoyer l'ordonnance complétée et signée par un médecin à l'adresse mail suivante : phelonco@phel.ch
- 3) Appeler la PHELONCO au 058 773 57 41 afin de confirmer le traitement.

Hors de ces heures

- Patient ambulatoire : Si, après **évaluation clinique**, l'administration de l'anticorps doit tout de même se faire durant le week-end et ne peut attendre le lundi, les patients valaisans doivent être redirigés vers l'Hôpital de Sion et les patients vaudois vers le CHUV.
- Patient hospitalisé : durant le week-end, il n'y a pas de possibilité de commander et administrer l'anticorps ; l'administration se fera alors le lundi.

2. Administration

La poche livrée par la pharmacie se présente sous cette forme :




Sortir la poche du frigo environ 30 minutes avant l'administration afin d'attendre la température ambiante.



Ne pas agiter le flex !

Veillez utiliser le système de perfusion Cyto-Ad Z[®] Inline 1 site avec 4 voies pour l'administration de ces poches (magasin central : n° article 3855 TUBULURE 4 VOIE P/ONCOLOGIE UU) :

- 1) Rincer la tubulure à l'aide du liquide rinçage (NaCl 0.9%)
- 2) Clamper la tubulure de la poche de rinçage (point A.)
- 3) Connecter la poche d'anticorps à la tubulure (point C.)
- 4) Déclamper la tubulure de la poche d'anticorps (point B.) après avoir bien vérifié que le point A soit clampé (s'il ne l'est pas la perfusion d'anticorps risque de remonter dans l'hydratation)
- 5) Administrer l'anticorps sur une voie périphérique par gravité ou avec une pompe selon la durée spécifiée sur la poche
- 6) Une fois l'administration terminée, clamper la tubulure de la poche d'anticorps (point B.)
- 7) Rincer la tubulure avec minimum 50 ml de NaCl 0.9%.



2.1. Résumé des caractéristiques

	Sotrovimab (Xevudy [®])
Solvant	NaCl 0.9% 100 ml
Tubulure (déjà fixée sur la poche livrée par la PHEL)	Tubulure filtre
Temps administration	30 min
Conservation	1 jour au frigo

3. Surveillance et précautions

- Le patient doit rester en observation à l'hôpital pendant une heure après la fin de l'administration en raison du risque d'hypersensibilité. Il est nécessaire d'avoir le matériel pour la prise en charge d'une réaction allergique.
- En cas d'apparition de signes ou symptôme d'une hypersensibilité, la perfusion doit être immédiatement arrêtée.
- Des réactions liées à la perfusion de gravité modérée ont été documentées : nausées, étourdissements, maux de tête, hyperhydrose, hypersensibilité aux stimuli, éruptions cutanées et vomissements.
- Interaction : aucune connue à ce jour
- Grossesse / Allaitement : pas de donnée - voir analyse théorique dans l'info professionnelle.



Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire par Swissmedic permettant l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé sont tenus de déclarer toute suspicion d'effet secondaire nouveau ou grave.

En cas de questions, vous pouvez joindre la Hotline de l'assistance pharmaceutique au 058 773 42 14.