

MIDAZOLAM 2 mg/ml

Sédatif, hypnotique

1 ampoule = 50 mg = 10 ml

Préparation/dilution

Midazolam 100 mg = 2 amp	20 ml
Dilution NaCl 0.9% ou G5%	30 ml
Total	50 ml

Administration

1 ml = 2 mg
1 ml/h = 2 mg/h

Compatibilités et incompatibilités

Voir le tableau d'incompatibilité pour les médicaments couramment administrés en IV continu.

Compatibilités additionnelles :

Compatible : Cefazoline, Digoxine, Erythromycine, Fluconazole, Gentamicine, Metronidazole, Metoclopramide, Ondansetron, Ranitidine, Vancomycine

Incompatible : Acyclovir, Albumine, Amoxicilline, Amphotericin B, Bicarbonate de sodium, Cefepime, Ceftazidime, Cefuroxime, Co-Amoxicilline, Dexaméthasone, Diazépam, Ertapenem, Floxacilline, Halopéridol, Hydrocortisone, Ketorolac, Piperacilline/Tazobactam, Triméthoprim/Sulfaméthoxazole

Effets secondaires principaux et surveillance

- Dépression respiratoire, diminution de la TA, réaction paradoxale, douleurs possibles au point d'injection
- Surveillance : paramètre vitaux, surveillance respiratoire étroite, état de conscience

Remarques

- Changement de seringue aux 48h.
- Bolus et perfusions sur voies centrales et périphériques.
- **ANTIDOTE : FLUMAZENIL**

Références : REFMED/FAMI, Micromedex consulté mars 2022, Swissmedicinfo, Création : SM/ALB, mars 2022, Validation SW/MCL