


|  |  |
|--|--|
| <p><b>Contenu de l'emballage :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 vial : <b>Tixagevimab</b> 150 mg (1.5 ml)</li> <li>• 1 vial : <b>Cilgavimab</b> 150 mg (1.5 ml)</li> </ul> |  |
| <p><b>Conservation :</b> réfrigérateur (2°C – 8°C)</p>   |  |
| <p><b>N° OPALE :</b> 25523</p>   |  |

## 1. Posologie usuelle

| Indication  | Dosage  | Posologie   |
|---|---|---|
| <b>Prophylaxie pré-exposition</b><br>= 2 emballages         | <b>Tixagevimab</b> 300 mg<br>(= <b>2 fioles de 150 mg</b> = 2 x 1.5 ml) | Injection intramusculaire de tixagevimab 300 mg et cilgavimab 300 mg, à répéter tous les six mois tant que le SARS-COV2 circule |
|   | <b>Cilgavimab</b> 300 mg<br>(= <b>2 fioles de 150 mg</b> = 2 x 1.5 ml)  |   |
| <b>Traitement COVID-19 (risque élevé)</b><br>= 2 emballages | <b>Tixagevimab</b> 300 mg<br>(= <b>2 fioles de 150 mg</b> = 2 x 1.5 ml) | Injection intramusculaire de tixagevimab 300 mg et cilgavimab 300 mg, en dose unique (répéter tous les six mois)                |
|   | <b>Cilgavimab</b> 300 mg<br>(= <b>2 fioles de 150 mg</b> = 2 x 1.5 ml)  |   |

Pour plus de détails quant aux indications et posologies, merci de vous référer au site intranet HRC, page Coronavirus [Intranet - Accueil - Recommandations PCI, traitements et procédures \(fhv.ch\)](#)

Réf : Recommandations de la Société Suisse d'Infectiologie (SSI) concernant le traitement précoce et la prophylaxie du COVID-19, version du 04 août 2022

## 2. Prescription

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Patient ambulatoire</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Remplir l'ordonnance de l'OFSP :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prophylaxie pré-exposition : <a href="#">Ordonnance OFSP – Evusheld (Prophylaxie)</a></li> <li>• Traitement : <a href="#">Ordonnance OFSP – Evusheld (Traitement)</a></li> </ul> </li> </ol>  |
| <b>Patient hospitalisé</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Remplir l'ordonnance de l'OFSP :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prophylaxie pré-exposition : <a href="#">Ordonnance OFSP – Evusheld (Prophylaxie)</a></li> <li>• Traitement : <a href="#">Ordonnance OFSP – Evusheld (Traitement)</a></li> </ul> </li> <li>Prescrire dans le dossier du patient :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Services prescrivants dans Soarian</u> : Prescrire Evusheld® directement dans Soarian comme pour toute autre médication</li> <li>• <u>Services ne prescrivant pas dans Soarian</u> : Prescrire Evusheld® comme tout autre médicament hors-liste via le formulaire habituel <a href="#">Ordonnance interne - HRC</a></li> </ul> </li> </ol> <p>La prescription sera ensuite traitée comme toutes ordonnances hors-liste.</p> |

## 3. Commande / Obtention

|                            | Durant les heures d'ouverture de la pharmacie (8h-16h30)<br>→ fabrication au laboratoire stérile de la pharmacie   | En dehors des heures d'ouverture  |
|----------------------------|--|---|
| <b>Patient ambulatoire</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Envoyer l'ordonnance complétée et signée par un médecin à l'adresse mail suivante : <a href="mailto:phelonco@phel.ch">phelonco@phel.ch</a></li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Envoyer l'ordonnance complétée et signée par un médecin à l'adresse mail suivante : <a href="mailto:pharmacie@phel.ch">pharmacie@phel.ch</a></li> </ol>          |
| <b>Patient hospitalisé</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Appeler la PHELONCO au 058 773 57 41 et confirmer le traitement (heure de livraison souhaitée, etc.)</li> </ol>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Aller chercher le médicament dans la <a href="#">Pyxis de dépannage</a>.</li> <li>Le fabriquer directement dans le service (cf. point 4. Préparation)</li> </ol> |

#### 4. Préparation

|                     |   |
|---------------------|---|
| Matériel nécessaire | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 boîtes d'Evusheld®</li> <li>• 2 aiguilles de prélèvement</li> <li>• 2 seringues de 5 mL</li> <li>• 2 aiguilles intramusculaires (moyen fessier)</li> </ul>   |
| Mode de préparation | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortir le produit du réfrigérateur 30 minutes avant administration.</li> <li>• Fioles prêtes à l'emploi.</li> <li>• <b>Ne jamais associer les deux anticorps dans une même seringue,</b> une seringue par anticorps.</li> </ul> <p>Se référer à la <a href="#">Fiche Refmed/FAMI - Evusheld – injection IM</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélèvement d'une dose totale de 300mg de tixagévimab (deux fioles) soit au total 3 mL dans une seringue de 5mL</li> <li>• Prélèvement d'une dose totale de 300mg de cilgavimab (deux fioles) soit au total 3 mL dans une seringue de 5mL</li> </ul> |
| Conservation        | <b>Conservation après préparation : 4 heures entre 2-25°C</b>   |

#### 5. Administration

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Site d'administration | Administration des anticorps monoclonaux en intramusculaire (IM) sur deux sites différents, en privilégiant le muscle moyen fessier droit et gauche. |
|-----------------------|--|