

PANTOPRAZOL

IPP, anti-ulcéreux

1 amp. subs sèche = 40mg

Préparation/dilution VVC

Pantoprazole 80 mg = 2 amp. =	20 ml
NaCl 0.9% ou G5%	20 ml
Total	40 ml

Administration

1 ml = 2 mg
4 ml/h = 8mg/h

Préparation/dilution VVP

Pantoprazole 80 mg = 2 amp. =	20 ml
NaCl 0.9% ou G5%	80 ml
Total	100 ml

Administration

1 ml = 0.8 mg
10 ml/h = 8mg/h

Compatibilités et incompatibilités

Voir le tableau d'incompatibilité pour les médicaments couramment administrés en IV continu.

Effets secondaires principaux et surveillance

- Thrombophlébite au site d'injection, troubles digestifs, céphalées

Remarques

- Changement de seringue/ perfusion **aux 12h**.
- pH très basique (9-10.5) à administrer de préférence seule car beaucoup d'incompatibilités IV. Vérifier avec le tableau de compatibilité en Y → si besoin et après validation avec l'équipe médicale, une administration discontinue peut être envisagée : 40mg aux 6-12h.

Références : REFMED/FAMI, Micromedex consulté en janvier 2023, Uptodate, Swissmedinfo, Création : ALB, juillet 2018. MAJ : SG, Janvier 2023. Validation : SW