

Fentanyl patches : information pour les patients

Information à l'attention des patients utilisant les patchs transdermiques de fentanyl (opioïde)

Les patchs de fentanyl peuvent exister sous les noms suivants : Fentalis®, Durogésic®, Fentanyl®.

Comment agit le patch ?


Le patch contient un médicament analgésique de la famille des opiacés.

Une fois le patch collé sur la peau, le médicament pénètre sous la peau pour y faire un dépôt. Puis il diffuse dans la circulation sanguine pour rejoindre le cerveau où il déploie son action. Il agit donc sur l'ensemble du corps et il n'est pas nécessaire de le coller à l'endroit douloureux.

Le patch libère de manière continue le médicament pendant 72h.

Comment utiliser le patch ?

- Déchirez délicatement le sachet en commençant au niveau de l'encoche marquée d'une flèche (au besoin, découpez le bord du sachet sur 2 mm à cet endroit en prenant garde de ne pas couper le patch).
- Prenez les deux parties de l'ouverture du sachet et écartez-les.




- Sortez le patch de l'emballage
- Retirez la pellicule de protection en évitant de poser les doigts sur la partie adhésive.
- Collez le patch sur la peau et maintenez une légère pression dessus pendant 30 secondes.
- Assurez-vous que le patch colle bien notamment sur les bords.
- Notez la date de pose du patch et l'emplacement sur un papier (dos de la feuille).

Document informatif téléchargé à partir de www.phel.ch. La PHEL décline toute responsabilité suite à une utilisation de ces informations hors de ses établissements partenaires. La documentation disponible peut être utilisée librement, pour autant que le but ne soit pas commercial et que la source soit citée.

Document élaboré par l'Equipe mobile intrahospitalière de soins palliatifs EMiSP (Hôpital Riviera-Chablais) avec la collaboration des pharmaciens de la PHEL

Quelles précautions avant l'emploi ?

- Retirez le patch précédent (risque de surdosage si cumul de patches).
- A chaque changement de patch, choisissez un emplacement différent, exempt de plis cutanés ou de poils, en vous référant au schéma ci-contre .:



- Evitez le contact direct du patch avec des sources de chaleur (bain chaud, bouillote, bain de soleil, coussin ou siège de voiture chauffant). En cas de fièvre, la diffusion du médicament peut être modifiée il faut alors avertir rapidement le médecin.
- Evitez d'inscrire directement sur le patch, cela peut l'endommager.
- Si le patch se décolle, remplacer le par un nouveau patch sans attendre car l'efficacité dépend de sa bonne adhésion.
- Il est possible de renforcer l'adhésion du patch en renforçant les bords avec de l'adhésif médical mais évitez de le recouvrir totalement. Si les patches se décollent régulièrement parlez-en au pharmacien ou à l'infirmière.
- Les patches étant imperméables, la baignade et la douche sont possibles. Evitez toutefois de frotter le patch lui-même ainsi que l'eau très chaude.
- Si la peau est poilue, ne la rasez pas (le rasage irrite la peau). Coupez plutôt les poils le plus près possible de la peau.
- Contrôlez au réveil la bonne adhérence du patch.

Document informatif téléchargé à partir de www.phel.ch. La PHEL décline toute responsabilité suite à une utilisation de ces informations hors de ses établissements partenaires. La documentation disponible peut être utilisée librement, pour autant que le but ne soit pas commercial et que la source soit citée.

Document élaboré par l'Equipe mobile intrahospitalière de soins palliatifs EMiSP (Hôpital Riviera-Chablais) avec la collaboration des pharmaciens de la PHEL

Effets indésirables

Enlevez le patch et contactez immédiatement un médecin si vous remarquez que la personne portant le patch présente les symptômes suivants : Respiration lente, somnolence inhabituelle, cauchemars, hallucinations, démangeaisons ou rétention urinaire.

Des effets indésirables tels que fatigue, somnolence, nausées, vomissements, rougeurs sous le patch, constipation ou sécheresse de la bouche peuvent survenir. Il est important d'en parler au médecin ou à l'infirmière.

Où jeter le patch après usage ?

Pliez le patch usagé en deux (faces collantes à l'intérieur).
Éliminez dans les ordures ménagères.

Numéros d'urgence si problème

.....

.....

.....

.....

Document informatif téléchargé à partir de www.phel.ch. La PHEL décline toute responsabilité suite à une utilisation de ces informations hors de ses établissements partenaires. La documentation disponible peut être utilisée librement, pour autant que le but ne soit pas commercial et que la source soit citée.

Document élaboré par l'Équipe mobile intrahospitalière de soins palliatifs EMiSP (Hôpital Riviera-Chablais) avec la collaboration des pharmaciens de la PHEL

Nom.....Prénom.....

Nom du patch et dosage

Journal du patch

Notez la date de la pose et la localisation

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam

Document informatif téléchargé à partir de www.phel.ch. La PHEL décline toute responsabilité suite à une utilisation de ces informations hors de ses établissements partenaires. La documentation disponible peut être utilisée librement, pour autant que le but ne soit pas commercial et que la source soit citée.

Document élaboré par l'Equipe mobile intrahospitalière de soins palliatifs EMiSP (Hôpital Riviera-Chablais) avec la collaboration des pharmaciens de la PHEL